

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE-ARDENNE

(ARDENNES, AUBE, MARNE, HAUTE-MARNE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

62, Avenue Nationale, La Neuville, B.P. 1154, 51056 Reims Cedex, Tél. 09.06.43 - 09.27.46

DLP 11-7-79146315

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

ABONNEMENT ANNUEL

C.C.P. CHALONS-sur-MARNE 2.800.67 W

Régisseur de Recettes de la Direction
Départementale de l'Agriculture
à Châlons-sur-Marne

BULLETIN n° 20 - 10 Juillet 1979

Abonnement annuel : 60 F.

GRANDE CULTURE

La période sèche que nous subissons depuis une vingtaine de jours a favorisé l'évolution des pucerons, leurs ennemis les plus actifs, les champignons entomophthorales ayant leur développement limité par les conditions climatiques.

Sur betteraves on constate la présence du puceron noir dans le "cœur" de nombreuses plantes. Sauf sur cultures très tardives, ne couvrant pas encore le sol, un traitement ne s'impose pas car les plantes sont peu affectées et une régression rapide des populations ne devrait pas tarder à intervenir sous l'action des hyperparasites.

Sur céréales ressemées et céréales de printemps les populations observées sur feuilles et pieds ne se déplacent pas vers les épis, étant surtout constituées par *Rhopalosiphum* et *Metopolophium*, espèces qui restent inféodées aux feuilles.

L'apparition d'ailés et l'état de végétation de ces céréales, atteignant le stade grain laiteux-semi pâteux, laissent supposer une régression prochaine des populations, déjà affectées par un parasitisme naturel.

Tout traitement est donc déconseillé.

Sur céréales très tardives atteignant seulement le stade floraison, le maintien d'une surveillance est recommandé.

Mildiou de la pomme de terre : La situation est satisfaisante. Toutefois si des pluies surviennent il serait bon de renouveler la protection des cultures à défaner ou à arracher après le 25 juillet.

VIGNE

Mildiou : La protection doit être maintenue. Une intervention s'impose dans les vignes n'ayant pas reçu le traitement recommandé dans notre précédent avis.

Oïdium : La chaleur humide d'hier est particulièrement favorable à ce champignon, ainsi d'ailleurs qu'à la pourriture grise.

Rougeot : De nombreuses taches ont fait leur apparition durant le week-end en diverses situations. Dans les parcelles les plus attaquées il sera intéressant de modérer les rognages, de façon à remplacer les feuilles détruites par ce champignon.

Cochenilles : les éclosions sont pratiquement terminées. Dans les parcelles atteintes une intervention devra avoir lieu dans la semaine. Oleoparathion ou oleomalathion font preuve d'une excellente efficacité.

Le Chef de la Circonscription
Phytopathologique CHAMPAGNE,

J. DELATTRE

7274